

بسمه تعالی

اطلاعات دارویی داروهای جدید



تهیه کننده : دکتر پریسا علی نژاد

تنظیم کننده : فرانک اسدی شریف (سوپروایزر آموزشی)

زمستان ۱۳۹۵

جهت آشنایی همکاران محترم از این فهرست، داروهای مرتبط با فارماکوپه بیمارستان دکتر فاطمی انتخاب و مورد بحث قرار گرفته است.

نام دارو: Donepezil - دونپزیل	دسته دارویی: داروهای ضد زوال عقل
نام تجاری: Aricept- Alpezil	
طبقه بندی فارماکولوژیک: مهارکننده برگشت پذیر و انتخابی استیل کولین استراز	
اشکال دارویی: قرص خوراکی 5, 10mg	
موارد مصرف: الف) درمان علامتی دمانس خفیف تا متوسط در بیماری آلزایمر ب) درمان دمانس واسکولار	
تداخل دارویی: مصرف همزمان با NSAID ها سبب افزایش ترشح اسید معده می شود کار با مازپین، دگزامتازون، فنوباریتال، فنی توئین و ریفامپین باعث تشدید دفع دونپزیل می شوند مصرف همزمان این دارو با سوکسینیل کولین و بتانکول سبب تشدید اثرات دارو می گردد.	
عوارض جانبی: بیقراری، آتاکسی، دپرسیون، سرگیجه، خستگی، بیخوابی، تحریک پذیری، تشنج، ترمور، تاری دید، کاتاراکت، تکررادرار، فیبریلاسیون دهلیزی، کاهش وزن و عوارض گوارشی برونشیت، کهیر و افزایش لیبدو	
مصرف در بارداری: جز گروه C می باشد	

نام دارو: xylometazoline - گزیلو متازولین	دسته دارویی: داروهای مهارکننده سرفه، خلط آورها و ضد احتقان بینی
هیدروکلراید	
نام تجاری: Eptifibatido	
طبقه بندی فارماکولوژیک: سمپاتومیمتیک؛ اثر مستقیم و فعالیت قابل توجه الفا-آدرنرژیک	
اشکال دارویی: اسپری 0.1 %	
موارد مصرف: فرم هیدروکلراید آن جهت تسکین علائم احتقان بینی کاربرد دارد.	
تداخل دارویی: تمامی ضد احتقان های سمپاتومینیک بینی در صورت مصرف طی درمان با یک MAOI باعث حملات افزایش فشار خون می شوند.	
عوارض جانبی: خشکی مخاط بینی، واکنش های افزایش حساسیت، افزایش فشار داخل چشم، قرمزی چشم، سردرد، تهوع و خستگی	

مصرف در بارداری : جزء گروه C میباشد

دسته دارویی : داروهای قلبی - عروقی	نام دارو: Eptifibatido - اپتیفیباتید
	نام تجاری : ایتتگریلین
طبقه بندی فارماکولوژیک : داروی ضد پلاکت	
اشکال دارویی : آمپول 2mg/ml و 750mcg/m	
موارد مصرف: معمولا در ترکیب با آسپرین و هپارین در درمان آنژین نا پایدار و در بیمارانی که میخواهند تحت عمل انژیوپلاستی عروق کرونر و پروسه های استنت گذاری قرار بگیرند کاربرد دارد.	
تداخل دارویی : مصرف همزمان با کلوییدوگرال، دی پیریدامول، NASID و داروهای ضد انعقاد خوراکی، ترومبولیتیک ها و تیکلو پیدین ریسک خونریزی را افزایش می دهد	
عوارض جانبی: شایعترین عارضه جانبی آن خونریزی است. افت فشار خون نیز گزارش شده است. مصرف در بارداری : جزء گروه B می باشد.	
مصرف در بارداری :	

دسته دارویی : داروهای قلبی - عروقی	نام دارو: دابی گاتران - dabigatran
	نام تجاری : دابی گاترون و پراداک
طبقه بندی فارماکولوژیک : مهار انعقاد از طریق مهار فعالیت های ترومبین	
اشکال دارویی : کپسول 75 و 110 و 150mg	
موارد مصرف: پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای	
تداخل دارویی : آمیودارون، کتوکونازول، NSAID، وراپامیل و سایر داروهای ضد انعقادی اثر این دارو را افزایش می دهند.	

عوارض جانبی: سوء هاضمه (شامل درد و ناراحتی شکمی و ناراحتی اپی گاستریک) و خونریزی

مصرف در بارداری: جزء گروه C می باشد.

نام دارو: فلکاینید - flecainide	دسته دارویی: داروهای قلبی و عروقی
نام تجاری: تامبوکور	
طبقه بندی فارماکولوژیک: گروه آنتی اریتمی های IC	
اشکال دارویی: قرص خوراکی 100mg و 50 و آمپول 10mg/ml	
موارد مصرف: درمان اریتمی های شدید بطنی علامت دار همانند تاکی کاردی بطنی پایدار، PVC و تاکی کاردی بطنی غیر پایدار که به دیگر درمان ها پاسخ نداده و درمان اریتمی شدید فوق بطنی علامت دار	
تداخل دارویی: -	
عوارض جانبی: عوارض سیستم عصبی مرکزی شامل سرگیجه، اختلالات دید و سبکی سر، تهوع، سردرد و لرزش نوروپاتی محیطی آتاکسی و پاراستزی، دیسکنزی و تشنج - واکنش های پوستی و حساسیت به نور و ندرتا اختلالات کبدی و آثار قلبی و عروقی	
مصرف در بارداری: جزء گروه C می باشد.	

نام دارو: بوتیلینوم - Botulinum toxins	دسته دارویی: داروهای شل کننده عضلات
نام تجاری: دیسپورت و نورونوکس	
طبقه بندی فارماکولوژیک: مهار ریلیزاستیل کولین و بلوک نورو ماسکولار ترمینال های اعصاب حرکتی	
اشکال دارویی: ویال 500 IU و 300 و 100	
موارد مصرف: درمان اسپاسم همی فاسیال، بلفار و اسپاسم ، اسپاسیتی اندام تحتانی همراه با سکتة درمان استرابیسموس و هایپر هیدروزیس - درمان آرایش برای رفع چین و چروک های صورت	

تداخل دارویی : از نظر تئوریکال تجویز همزمان آن با سایر داروهای بلوک کننده نوروماسکولار مانند آمینو گلیکو زیدها و اسپکتینومایسین سبب تشدید اثرات دارو می شود.

عوارض جانبی: احساس سوزش گذرا، کبودی در سایت تزریق، واکنشهای حساسیتی، تشنج، اریتمی و انفارکتوس میوکارد. در صورت تزریق در ماهیچه های اطراف چشم احتمال افتادگی پلک، فتوفوبیا، تعریق صورت، اشک ریزش و دو بینی وجود دارد. در صورت تزریق در اندام تحتانی احتمال افتادن درد پا، ضعف در محل تزریق و ضعف عمومی وجود دارد.

مصرف در بارداری : جزء گروه C می باشد.

دسته دارویی : داروی قلبی -عروقی	نام دارو: دیزو پیرامید -Disopyramide
	نام تجاری : پاروکستین
طبقه بندی فارماکولوژیک : پاسخ دهی عضله قلب و سرعت الکتروفیزیولوژیک آن را تضعیف می کند	
اشکال دارویی : کپسول 100 و 150mg	
موارد مصرف: پیشگیری و درمان اریتمی های بطنی و فوق بطنی	
تداخل دارویی : مصرف همزمان با سایر انتی آریتمی ها به ویژه دیلتیازم، پروکائین امید، لیدوکائین، بتابلوکرها و وراپامیل با احتیاط صورت گیرد و آریترومایسین باعث افزایش غلظت دارو در بدن می گردد.	
عوارض جانبی: تحریک مجرای گوارشی، ضعف عضله قلب، کاهش فشار خون، انسداد دهلیزی -بطنی و اثرات ضد موسکارینی مانند خشکی دهان، تاری دید و احتباس ادرار. سایکوز، یرقان انسدادی و کاهش قند خون	
مصرف در بارداری : گروه C	

دسته دارویی : داروهای ضد افسردگی	نام دارو: پاروکستین-Paroxetine
	نام تجاری : سروکسات
طبقه بندی فارماکولوژیک : مانع باز جذب سروتونین می گردد.	
اشکال دارویی : قرص خوراکی 100mg و 30 و 20	

موارد مصرف: در درمان افسردگی، و وسواس جبری، اختلالات پانیک، فوبیا و اختلالات اضطراب نقش کاربردی دارد.
تداخل دارویی: همانند سایر SSRI
عوارض جانبی: همانند سایر SSRI و واکنشهای اکسترا پیرامیدال (خارج هرمی) شامل ریستونی حلقی دهانی و هم چنین علائم ترک دارو گزارش گردیده است. احتمال تشدید علائم پانیک در مراحل اولیه شروع درمان وجود دارد.
مصرف در بارداری: جزء گروه D می باشد

نام دارو: سفاکلر - cefaclor	دسته دارویی: داروهای ضد باکتری
نام تجاری: -	
طبقه بندی فارماکولوژیک: سفالوسپورین نسل 2	
اشکال دارویی: سوسپانسیون 250mg/5ml و 125 و کپسول و قرص 500mg و 250	
موارد مصرف: علیه باکتریهای گرم منفی مثل اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیا، نایسریا گنوره آ و پروتیوس میرابیلیس و مخصوصا هموفیلوس انفولانزا فعالیت بیشتری دارد.	
تداخل دارویی: همانند سفالکسین	
عوارض جانبی: همانند سفالکسین	
مصرف در بارداری: جز گروه B	

نام دارو: سفوروکسیم - Cefuroxime	دسته دارویی: داروهای ضد باکتری
نام تجاری: فارینات	
طبقه بندی فارماکولوژیک: سفالوسپورین نسل 2	
اشکال دارویی: سوسپانسیون 125,250 mg/5ml - قرص روکش دار 250,500 mg - ویال 250,500,1500 mg	
موارد مصرف: در درمان عفونت های متعدد مثل عفونت استخوان و مفاصل، برونشیت و دیگر عفونت های راه تنفسی تحتانی، گونوره آ، مننژیت، اوتیت مدیا، پربتونیت، فارنژیت، سینوزیت، عفونت های پوستی و	

عفونت بافت نرم و راه ادراری کاربرد دارد. همچنین بعنوان پروفیلاکسی عفونت های جراحی کاربرد دارد.
تداخل دارویی: پروبنسید باعث کاهش درکلیرانس کلیوی این دارو می شود.
عوارض جانبی: عوارض گوارشی و ندرتاً سندرم استیون جانسون و نکروز سمی اپیدرم در کودکان کاهش شنوایی ملایم تا متوسط در طی درمان با این دارو بخاطر منزیت دیده شده است.
مصرف در بارداری: گروه B

نام دارو: دالتپارین - Dalteparin	دسته دارویی: داروی قلبی عروقی
نام تجاری: فراگمین	
طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتق هپارین با وزن ملکولی پائین	
اشکال دارویی: سرنگ آماده 2500,5000,7500,10000 u/0.3ml	
موارد مصرف: پروفیلاکسی در برابر ترومیوز وریدهای عمقی در بیمارانی که عمل جراحی شکمی دارند. پروفیلاکسی DVT در بیماران تحت جراحی تعویض هیپ بیمارانی باریسک مشکلات ترومبوآمبولیک ناشی از محدودیت حرکتی	
تداخل دارویی: مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی (وارفارین، آسپرین، NSAID) و مهار کننده های پلاکتی ممکن باعث افزایش ریسک گردد.	
عوارض جانبی: تب، هموراژی، ترومبوسیتوپنی، هماتوم، راش، اکیموز، درد و نکروز در محل تزریق	
مصرف در بارداری: گروه B	
مصرف در بارداری: -	

نام دارو: کولیستی متات سدیم-Colistin	دسته دارویی: داروهای ضد باکتری
نام تجاری: کلستین	
طبقه بندی فارماکولوژیک: آنتی بیوتیک از دسته پلی میکسین ها	
اشکال دارویی: آمپول 1/000/000-قرص 1/500/000-سوپانسیون 2/500/000 u/5ml	
موارد مصرف: در درمان باکتری های حاد گرم منفی بخصوص گونه سودومونا ایروژینوزا کاربرد دارد از راه	

خوراکی در درمان عفونت های دستگاه گوارش در بیماران که در معرض ریسک خطر بالای عفونت داخلی هستند کاربرد دارد.

تداخل دارویی : -

عوارض جانبی: مصرف دراز مدت این دارو ممکن باعث رشد سایر باکتری های پیش بینی نشده گردد . درد و تحریک موضعی در تجویز عضلانی دیده می شود

مصرف در بارداری : گروه C

نام دارو: اتودولاک - Etodolac	دسته دارویی : داروهای مسکن، ضد التهاب و ضد تب
طبقه بندی فارماکولوژیک : NSAIDS	
اشکال دارویی : کپسول 300 mcg -قرص خوراکی 400 mcg -قرص 600 mg SR	
موارد مصرف: ارتروز روماتوئید - ارتروز ایدیوپاتیک جوانان - استئوآرتریت و درمان های حاد	
تداخل دارویی : همانند سایر NSAIDها	
عوارض جانبی: همانند سایر NSAIDها و همچنین ممکن است باعث افزایش موارد مثبت کاذب برای بیلی روبین در ادرار شود.	
مصرف در بارداری : گروه C	

نام دارو: پرگابالین - Pregabalin	دسته دارویی : داروهای ضد صرع
طبقه بندی فارماکولوژیک : عامل سیستم عصبی مرکزی	
اشکال دارویی : قرص و کپسول 50,75,150,200,300 mg	
موارد مصرف: درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه درمان اختلالات اضطراب ژنرالیزه و درمان درد نوروپاتیک	

تداخل دارویی : مصرف همزمان با اویپوئیدها، بنزودیازپین ها و باربیتورتها سبب تشدید اثرات دپرسیون این دارو روی CNS می شود.
عوارض جانبی : سرگیجه، خواب آلودگی، اختلال توجه، مشکل در تطابق، تاری دید، افزایش اشتها
مصرف در بارداری : گروه C

نام دارو : میدودرین - Midodrine	دسته دارویی : داروهای قلبی عروقی
نام تجاری : گاترون	
طبقه بندی فارماکولوژیک : آگونیست گیرنده آلفا آدرنرژیک شریانها و وریدها	
اشکال دارویی : قرص خوراکی 2.5, 5 mg	
موارد مصرف : درمان افت فشار خون سمپاتومیمتیک وضعیتی در بیمارانی که زندگی شان با وجود مراقبتهای استاندارد بالینی از جمله ساپورت، انفوزیون مایعات و تغییر در شیوه زندگی در معرض خطر می باشد درمان بی اختیاری ادرار	
تداخل دارویی : آلفا بلوکرها مثل پرازوسین و ترازوسین اثر انتاگونیستی بر انقباض عروقی این دارو دارند. گلیکوزیدهای قلبی ممکن است باعث برادیکاردی و اریتمی گردند. منقبض کننده های عروقی مثل ارگوتامین، افدرین، فنیل افرین - پسودو افدرین ممکنست اثر انقباض عروق این دارو را افزایش دهند.	
عوارض جانبی : پاراستزی ، سردرد، گیجی، اضطراب، افکار غیر عادی، عوارض پوستی مثل خارش پوست سر و راش، عوارض گوارشی مثل خشکی دهان و درد شکمی و عوارض قلبی مثل افزایش فشار خون نشسته و خوابیده و برادیکاردی و عوارض مثل لرزش، فلاشینگ صورت و احساس سنگینی و فشار در سر	
مصرف در بارداری : گروه C	

نام دارو : نفوپام - Nefopam	دسته دارویی : داروی مسکن، ضد التهاب و تب
نام تجاری : آکوپان	
طبقه بندی فارماکولوژیک : ضد درد غیر اپیوئیدی	
اشکال دارویی : امپول 20mg / 2 ml	

<p>موارد مصرف: دردهای حاد مزمن، دردهای بعد از عمل جراحی، دندان درد، دردهای اسکلتی و ماهیچه ای، دردهای ناشی از ترومای حاد و دردهای سرطانی</p>
<p>تداخل دارویی: عوامل انتی کولی نرژیک و سمپاتومیمتیک باعث افزایش اثر دارو میگردد. همراه با ضد افسردگی سه حلقه ای و مهارکننده های MAO منع مصرف دارد.</p>
<p>عوارض جانبی: تهوع، خشکی دهان، احساس سبکی در سر، احتباس ادرار، گیجی، تاری دید، بیخوابی، سر درد، تاکیکاردی و واکنشهای ازدیاد حساسیت مثل اریتم مولتی فرم</p>
<p>مصرف در بارداری: گروه D</p>

<p>نام دارو: شارکول فعال- Activated charcoal</p>	<p>دسته دارویی: داروهای گوارشی</p>
<p>نام تجاری: بایوکربن - کربوگل - نوریت</p>	
<p>طبقه بندی فارماکولوژیک: آنتی اسید و عامل جذب سطحی مواد سمی</p>	
<p>اشکال دارویی: قرص خوراکی 250 mg - سوسپاسیون خوراکی 50 g</p>	
<p>موارد مصرف: برای درمان غیر اختصاصی اورژانس در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی مصرف می شود. همچنین درمان اسهال سوء هاضمه هیبر کلسترول لیما و کمک به جذب گازهای روده مصرف می شود</p> <p>توجه: این دارو در مسمومیت با سیانور کاملاً بی اثر و در مسمومیت با اسید های معدنی و بازهای سوزاننده، اتانول، متانول و املاح آن و مواد پاک کننده نسبتاً بی اثر است.</p>	
<p>تداخل دارویی: این دارو می تواند داروهای موجود در لوله گوارش را جذب کند و جذب استیل سیتین خوراکی و شربت اپیکا را کاهش می دهد.</p>	
<p>عوارض جانبی: ممکن است موجب تهوع و استفراغ شود.</p>	
<p>مصرف در بارداری: اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.</p>	